
**IDEACIÓN SUICIDA, EXPERIENCIAS PSICÓTICAS SUBUMBRALES Y
SÍNTOMAS DEPRESIVOS: ESTUDIO DE LA NATURALEZA DE SUS
RELACIONES A TRAVÉS DEL ENFOQUE DE REDES EN ADOLESCENTES DE
LA PROVINCIA DE TALCA**

**PÍA FRANCISCA MONJES VALDÉS
HERNÁN FELIPE VALDÉS ALEGRÍA
PSICÓLOGO**

RESUMEN

Las experiencias psicóticas subumbrales (EPS) o subclínicas son comunes en población adolescente y suelen ser de carácter transitorio, aunque cuando no remiten, se asocian a mayor presencia de trastornos psiquiátricos y en algunos casos podría sospecharse de una posible etapa inicial del pródromo psicótico. La literatura indica que existe una relación entre las EPS y la ideación suicida, la que podría explicarse por factores de riesgo comunes, especialmente psicopatologías, ya que la mayoría de las personas que cometen suicidio tienen un trastorno mental diagnosticable. El objetivo del presente estudio es determinar la naturaleza de las relaciones entre las EPS, síntomas depresivos e ideación suicida durante la vida (SUICL) en población adolescente, a través de un modelo de red transdiagnóstico, que permite visualizar las relaciones complejas existentes entre experiencias tradicionalmente divididas en categorías diagnósticas, acercándose de forma más fidedigna a la presentación comórbida y heterogénea de la psicopatología. Se midieron estas variables con un instrumento de autorreporte desarrollado a partir de un set de cuestionarios (CAPE-P15, BQSPS, DASS-21 y C-SSRS). Los resultados indican que la relación entre las EPS y la ideación suicida no es específica y que se encuentra mediada por los síntomas depresivos. Por tanto, es posible concluir que la asociación entre las EPS e ideación suicida se debe a factores de riesgo comunes, entre los que se encuentran los síntomas depresivos, lo que contribuye a una mejor comprensión de los factores asociados con la ideación suicida, para la consecuente generación de formas de diagnóstico e intervención temprana.

Palabras clave: Experiencias psicóticas subumbrales, ideación suicida, síntomas depresivos, enfoque de red transdiagnóstico.