

## VIII.-RESUMEN

La Caries del Biberón es una destrucción precoz de los tejidos duros de los dientes temporales que se presenta a medida que estos erupcionan y es desencadenada por el uso prolongado de nutrientes cariogénicos líquidos. Su presentación clínica es típica, involucrando primero a los incisivos superiores y luego a los primeros molares superiores e inferiores y caninos inferiores; los incisivos inferiores no están afectados porque son protegidos por la lengua al succionar la mamadera o pezón.

El propósito de este estudio fue determinar la Prevalencia de Caries del tipo Biberón en niños de 2 a 4 años que asisten regularmente al Control de Niño Sano en el Consultorio Sol de Septiembre en la ciudad de Curicó, la cual no cuenta con fluoración del agua potable. Se analizó además la relación entre la presencia de algunos factores de riesgo y la aparición de la patología.

Se determinó una muestra de 190 niños de 2 a 4 años 11 meses. La información se obtuvo a través de un examen clínico y una encuesta que indagaba acerca de los hábitos alimenticios y prácticas de salud bucal que fue completado por los padres. El criterio diagnóstico empleado para definir la presencia de Caries del Biberón fue el de Weerheijm K.L. (48). Para el análisis de los factores de riesgo se empleó el test de Chi-cuadrado ( $p \leq 0,05$ ).

Se determinó que la Prevalencia de Caries del tipo Biberón fue de un 34,73 %. La Prevalencia de Caries para la población en estudio fue de un 46 %. Se encontró una asociación significativa entre la presencia de Caries del tipo Biberón y la ausencia de higiene bucal posterior a la ingesta de pecho o biberón nocturno.