

7. RESUMEN.

Se realizó un estudio descriptivo-retrospectivo en donde se analizó información obtenida en base a 100 fichas clínicas e informes de biopsias en el Hospital Regional de Talca y el Hospital Base de Curicó entre los años 1995-2005. El objetivo de este estudio fue determinar las características clínicas y biodemográficas de los pacientes con diagnóstico de Neoplasia Maligna Oral en dichos establecimientos. Un total de 100 casos fueron utilizados, en cuanto a la distribución de los casos por año el 2001 y el 2003 fueron los años que presentaron una mayor cantidad de casos (15% cada uno); el género masculino fue el más afectado (86%), la proporción masculino-femenino fue de 6,14:1. El grupo etáreo más afectado más afectado fue el de 60 a 69 años (36%). El tipo histopatológico más común fue el Carcinoma de Células Escamosas (88%), dentro de estos el más común fue el que presentó grado de diferenciación tipo II de Broder (61,4%). En cuanto a los hábitos el consumo de tabaco más alcohol fue el más frecuente (65%) en pacientes con diagnóstico de Carcinoma de Células Escamosas. En cuanto a las zonas anatómicas afectadas las que presentaron mayor número de casos fueron el labio (39%). En cuanto a la zona anatómica según la CIE-AO las zonas mas afectadas fueron el labio inferior en la zona del bermellón (81%), el borde lateral de la lengua (55%), Piso de boca anterior (53%), Paladar blando (77%), y encía maxilar (83%). Sólo se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la ubicación anatómica y los hábitos de tabaco más alcohol presente en los pacientes con diagnóstico de carcinoma de Células Escamosas Oral. Los resultados de cáncer oral encontrados en este estudio pueden ser útiles en la región para diseñar programas de prevención, pesquisa y diagnóstico precoz.