

8. RESUMEN

INTRODUCCIÓN: Los AM presentan una alta incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas debido al efecto acumulativo y daño progresivo del organismo. Dentro de éstas patologías se encuentran las LPM y, por ende, el cáncer oral. **OBJETIVO:** Determinar la prevalencia de las lesiones potencialmente malignizantes en la mucosa oral de los pacientes Adultos Mayores bajo control en los consultorios Dr. Julio Contardo y Dr. José Dionisio Astaburuaga, Talca. **MATERIALES Y MÉTODO:** Se seleccionó una muestra probabilística estratificada de 200 sujetos a estudiar, a estos pacientes se les realizó una entrevista personal y un examen de la cavidad oral, previa firma de un consentimiento informado. **RESULTADOS:** Se encontró una prevalencia de un 15,6% (n=19) de LPM entre los pacientes estudiados. Se presentó una prevalencia de un 4,9% de leucoplasia, 3,3% de liquen plano y estomatitis nicotínica, 1,6% de eritroplasia y queilitis actínica y un 0,8% de leucoedema. El liquen plano presentó prevalencia por la mujer y la estomatitis nicotínica por el hombre. En relación a los factores de riesgo se reportó una baja prevalencia de tabaco y alcohol (7% y 3% respectivamente), así como también de exposición solar, 18%. El porcentaje de mala higiene oral fue de 41%, el de prótesis desajustada de un 58%, ambas cifras bastante altas. **CONCLUSIÓN:** Existe necesidad imperiosa de ampliar las políticas de salud del sector público hacia el AM e implantar programas con enfoques preventivos que puedan ser capaces de pesquisar todo este tipo de lesiones cuando aún no han mostrado ningún signo de malignización.

Palabra Clave: Lesión Potencialmente Malignizante, Leucoplasia, Liquen Plano, Eritroplasia, Queilitis Actínica.