



COMPARACIÓN DE ABORDAJE TERAPÉUTICO TRADICIONAL Y OTRO BASADO EN BIOFEEDBACK VISUAL EN PATOLOGÍAS VOCALES EN RELACIÓN A LA PERTURBACIÓN DE LA FRECUENCIA (JITTER)

**ISABEL OSORIO SÁNCHEZ
LICENCIADO EN FONOAUDIOLÓGÍA**

RESUMEN

La presente investigación tuvo por objetivo establecer si existen diferencias significativas en relación a la variación del porcentaje de la perturbación de la frecuencia (Jitter) en pacientes con disfonía disfuncional simple, que se sometieron a 8 sesiones terapéuticas con diferentes enfoques (Terapia Vocal Tradicional v/s Terapia Vocal Tradicional más Biofeedback Visual). Para comparar la variación del porcentaje de perturbación de la frecuencia (Jitter) , se realizó un análisis acústico pre y post terapia, acompañado de una evaluación perceptual de la voz y una telelaringoscopia, que permitió descartar daño orgánico.

El total de sujetos participantes del estudio correspondió a 18 personas, de los cuales 9 (3 hombres y 6 mujeres) recibieron terapia vocal tradicional y 9 (3 hombres y 6 mujeres), fueron sometidos a terapia vocal tradicional más biofeedback visual. De acuerdo a los porcentajes obtenidos, se evidenciaron resultados no significativos estadísticamente entre ambos enfoques terapéuticos, dado que la significancia para ambos grupos fue de 0,757, lo que indica que el porcentaje de perturbación de la frecuencia (Jitter), no tuvo una variación importante para ninguno de los enfoques terapéuticos empleados.