



**COMPARACIÓN DEL ABORDAJE TERAPÉUTICO TRADICIONAL Y OTRO
BASADO EN BIOFEEDBACK VISUAL EN PATOLOGÍAS VOCALES, EN
RELACIÓN AL PORCENTAJE DE LA PERTURBACIÓN DE
LA AMPLITUD (SHIMMER)**

**ANA CAROLINA HERNÁNDEZ CASTRO
LICENCIADO EN FONOAUDIOLÓGÍA**

RESUMEN

La presente investigación tuvo por objetivo establecer la existencia de diferencias significativas en relación a la variación del porcentaje de perturbación de la amplitud (Shimmer) en pacientes con disfonía disfuncional simple que se sometieron a 8 sesiones terapéuticas con diferentes enfoques.

(Terapia Vocal Tradicional v/s Terapia Vocal Tradicional más Biofeedback Visual). Para comparar la variación del porcentaje de perturbación de la amplitud (Shimmer), se realizó un análisis acústico pre y post terapia, acompañado de una evaluación perceptual de la voz y una telaringoscopia que permitió descartar daño orgánico. El total de sujetos participantes del estudio correspondió a 18 personas, de los cuales 9 (3 hombre y 6 mujeres) recibieron terapia vocal tradicional y 9 (3 hombres y 6 mujeres) fueron sometidos a terapia vocal tradicional más biofeedback visual. De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidenciaron resultados no significativos estadísticamente entre ambos enfoques terapéuticos, dado que la significancia fue 0,965, lo que indica que el porcentaje de perturbación de la amplitud no tuvo una variación importante para ninguno de los enfoques terapéuticos empleados.