



**“RELACIÓN ENTRE EL TIPO DE TRATAMIENTO RECIBIDO Y LA CALIDAD DE VIDA E INDICADORES SINTOMATOLÓGICOS EN PACIENTES ESQUIZOFRÉNICOS DE LA REGIÓN DEL MAULE”.**

**MARIANELLA ANDREA SÁNCHEZ HENRÍQUEZ.**

**PSICOLOGOY MENCION EN PSCOLOGIA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES**

**RESUMEN**

La presente investigación analiza la relación que existe entre el tipo de tratamiento recibido por el paciente esquizofrénico, específicamente el tratamiento farmacológico y psicosocial, con su sintomatología y calidad de vida. Lo anterior, con el fin de aportar en el acceso de los pacientes a un mejor nivel de recuperación y otorgar una mirada local del estado de los tratamientos recibidos por los pacientes esquizofrénicos de la región del Maule.

Se aplicó un instrumento de calidad de vida a 167 pacientes y uno de sintomatología a 141 que concurren a los hospitales y centros de rehabilitación en la región del Maule.

Los resultados apuntan a que los pacientes que reciben rehabilitación psicosocial perciben mejor su situación económica y se sienten más capaces de manejar su propio dinero, no encontrando una influencia significativa de este tipo de tratamiento en otras variables de calidad de vida, pero sí teniendo una gran significancia en la mejoría de la sintomatología negativa y general de estos pacientes. En el caso de la medicación recibida, los pacientes que se tratan con antipsicóticos atípicos tienen una mejor percepción de su entorno afectivo más cercano y también del tratamiento psiquiátrico que están recibiendo.

**Palabras claves:** Esquizofrenia, calidad de vida, sintomatología, tratamiento, rehabilitación psicosocial, antipsicóticos.

## ABSTRACT

This research analyzes the relationship between the type of treatment received by schizophrenic patients, specifically the antipsychotic and psychosocial treatment, and their symptomatology and quality of life. The goal of the study was to collect information on the critical variables of patient's recovery and to provide a local point view of the treatments conducted in the Maule Region and their outcomes.

A quality of life questionnaire was administered to 167 the patients attending to public health services in Chile and a symptomatology scale was administered to 146 of them.

The results indicated that patients who receive psychosocial rehabilitation perceive better their economic situation and feel more capable of handling their own money, without finding a significant influence of this type of treatment in other variables of quality of life, but having a great significance in the improvement of the negative and general symptomatology of these patients. In case of the medication received, the patients treated with atypical antipsychotic have a better perception of his close affective environment and also of the psychiatric treatment that they are receiving.

**Key words:** Schizophrenia, Quality of life, sintomatology, psicosocial approach, antipsychotic.